

Herzlich Willkommen





PD. Dr. med. Gunnar Riepe

Gefäßchirurg, Chefarzt
„Wundarzt aus Boppard“

Zentrum für Gefäßmedizin
und Wundbehandlung
Stiftungsklinikum Mittelrhein
Koblenz - Boppard

Anke Bültemann


Pflegeexpertin chronische Wunde
Vorstandsmitglied der ICW
Pflegerische Leitung

Wund Centrum Harburg WCH
Asklepios Klinikum Harburg

Hamburg




chronische Wunde




feuchte Wundbehandlung

durchblutet, feucht, geschützt, $>28^{\circ}\text{C}$, 2-4 Tage Ruhe



feuchte Wundbehandlung



Du



De



De



De

kein Puls ?


**feuchte
Wundbehandlung**



kein Blut !

Kompression

„Warum heilt es nicht?“



Wundursache




„ohne Strom, kein Licht!“

„ohne Blut, keine Heilung!“

„Was ich alles machen soll!“



„Und ich!“



„Na und ich
erst mal!“

4 menschliche Grundbedürfnisse

Quelle: Klaus Grawe, Psychotherapeut, Hamburg

- ~~Liebe und~~ **Anerkennung** (Bindungsbedürfnis) *Bezugsperson*
- **Ordnung** und **Sicherheit** (Kontrolle)
- ~~Lustgewinn und~~ **Unlustvermeidung** *Schmerz*
- **Selbstwerterhöhung** *Wahrnehmung*

Auf Augenhöhe





Unser Kampf gegen das Wasser




Unser Kampf gegen das Wasser

- Kompression
- Lymphdrainage (MLD)
- intermittierende Kompression
- Hochlagerung, Fußgymnastik
- Pelotte



VADOpnex System







Intermittierende Kompression



*häufig
abgelehnt*



Manuelle Lymphdrainage



häufig nicht
verordnet

Diagnose z. B.	Indikationsschlüssel	Verordnungsmenge im Regelfall	Verordnung außerhalb des Regelfalls
Lipödem	L1a	Max. 2x8 MLD (max. 12)	Nicht möglich
Hämatome nach Unfall oder Operation	Ly1b	Max. 2x8 MLD (max. 12)	Nicht möglich
Lymphödem, Lipolymphödem	Ly2a	Max. 5x8 MLD (max. 30)	In Einzelfällen möglich mit med. Begründung
Lymphödem nach Krebserkrankung	Ly3a	Max. 5x10 MLD (max. 50)	In Einzelfällen möglich mit med. Begründung

Nach Ablauf der Menge des Regelfalls muss bis zur nächsten Erstverordnung eine **Pause von mindestens 3 Monaten** zwischen der letzten durchgeführten MLD und der nächsten Verordnung eingehalten werden. Nur in besonderen, medizinisch begründeten Einzelfällen, kann dieses Auslassen der Pause entfallen und eine Verordnung außerhalb des Regelfalls erfolgen.


Tagebuch

- 3x tgl. 5-7min Fußgymnastik, kreisen, Fahrradfahren
- Ideen sammeln

„Was ich alles machen soll!“



„Und ich!“



„Na und ich
erst mal!“

Gehen ohne Druck



Vacoped Diabetic

(früher: Vacodiaped Schuh)



WCS Schuh




Total Contact



„Was ich alles machen soll!“



„Und ich!“



„Na und ich erst mal!“

Weiterer Wasser- Kampf



Lymphologische Wickelung mit Zehen



Bisgaard'sche Kulisse perimaleoläre Region








Flachstrickstrumpf mit Reißverschluss



„Medi-Butler“



Prävention



Konsensusempfehlung

Kompressionstherapie



Initiative Chronische Wunden e.
Am Brambusch 22
44536 Lünen

Nicht jedes
„offene Bein“
die gleiche

Teil 1: Die periphere
Dialyse

Experteninformationen



Nicht jedes
„offene Bein“
die gleiche

Teil 2: Die chronische
(CVI)- und
das Ulcus

Experteninformationen



„Zeigt her eure Füße“

Der Diabetische Fuß und
seine Prävention



Experteninformationen für Angehörige und Betroffene


2014

Informationsmaterial



„ DER WUNDUHRFÜHRERSCHEIN“

für Referenten und Lehrer im Bereich der Wundversorgung



WundUhr®

Bültemann & Riepe

Termin:
Samstag, d. 22. November 2014

Zielgruppe:
Lehrer/innen der Pflegeberufe
Referenten/innen zum Thema Wunde



wunduhr

www.wunduhr.de

